

• โรคไข้เลือดออกติดต่อยังไง ?

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเวที โดยยุงลายเป็นพาหะ
กัดผู้ที่ติดเชื้อแล้ว นำเชื้อไปสู่ผู้อื่น ระยะเวลาติดเชื้อ 3-5 วัน

• วิธีดูแลเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก



กินอาหารอ่อน


ดื่มน้ำให้เพียงพอ งดอาหารและน้ำที่มีสีดํา

ลดไข้

เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่นเป็นระยะ เชตามอล
ห้ามใช้ยาแอสไพริน

สังเกตอาการ

เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย
ปวดท้องมากขึ้น กินอาหารและน้ำไม่ได้
เลือดออกรุนแรง ไข้ต่ำลง
ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที



ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลลานสกา

ไข้เลือดออก



ภัยร้ายจากยุงลาย

• กลุ่มเสี่ยง

ทุกเพศทุกวัย พบบ่อยในเด็ก วัยเรียน
และวัยทำงานตอนต้น



• อาการโรคไข้เลือดออก

- มีไข้สูง - ปวดศีรษะ - ปวดกล้ามเนื้อ
- มีผื่นที่ผิวหนัง - ปวดกระดูก



**ระมัดระวังการติดเชื้อครั้งที่ 2
เพราะอาการรุนแรงกว่าครั้งแรก**



ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลลานสกา